

インプラント治療に関して 「サイン記入後提出お願いします・医院保管」

インプラント治療の手順

- ① インプラント植立手術 一次手術
その後、傷の消毒や抜糸で数回来院
約「 」ヶ月後 二次手術
ヒーリングアバットメント SET「歯肉の形を整える」
約 10 日後以降、最終補綴用の型取り
- ② 最終補綴装着
終了予定日 植立手術から約「 」ヶ月後

インプラント治療費	420,000 円（税込）
TEK（仮歯）	円（税込）
implant メーカー	アストラテックインプラントシステム
埋入本数	本
埋入予定部位	部
抜歯即時埋入費	円（税込）
GBR「人工骨費用」	円（税込）
ソケットリフト	55,000× 円（税込）
サイナスリフト	円（税込）
合計金額	円（税込）

石崎歯科医院ホームページ

「お口の教科書」または「石崎先生が本音で解説」の
●インプラント説明書●同意書●注意事項●を、すべて確認の上で下記サインをお願いします。

保証について（抜粋）

石崎歯科医院では、インプラント治療終了後 5 年間を保証期間としています。保証の条件として、指示されたナイトガードの使用、指定された 4 か月ごとの定期検診、医院から指示されたメンテナンスの継続をお願いしています。

インテグレーション「骨と結合」する確率は約 95%というデータがあります。しかし数パーセントはインテグレーションしない可能性があります。手技的なエラーか、体が異物反応を呈するかは診断不可です。そのため、徹底した滅菌物使用や環境、手技で挑みますが、インテグレーションしない場合は 2 回までトライします。2 回手術してもインテグレーションしない場合は中止し、別方法にて補綴を行います。追加で期間がかかる場合があります。

記入後、当医院のカルテに保管します。必要な方はご自身で複写をお取りください

同意済サイン 名前_____

インプラント治療について

石崎歯科医院 インプラント治療説明書

1. 石崎歯科医院のインプラント治療に対する考え方

歯を失った場合、その部分を補う方法として「ブリッジ」「義歯」「インプラント」などがあります。

石崎歯科医院では、単に失った歯を補うだけではなく、現在残っている歯をできるだけ長く守ることを大切にしています。

ブリッジや義歯は、設計によっては残っている歯に負担がかかることがあります。また、義歯では十分に回復することが難しい咀嚼能力を取り戻したいという患者様に対して、インプラントを治療選択肢の一つとしてご提案しています。

ただし、すべての患者様にインプラントをお勧めするわけではありません。お口全体の噛み合わせや残っている歯の状態などを総合的に診査し、その患者様にとってインプラントが適切かどうかを判断します。

2. 治療方法について

歯を失った場合には、主に以下の治療方法があります。

ブリッジ：失った歯の両隣の歯を支えとして、人工の歯を固定する方法です。

義歯（入れ歯）：取り外し式の人工の歯で、失った部分を補う方法です。

インプラント：顎の骨に人工歯根（インプラント）を埋め込み、その上に人工の歯を装着する方法です。

それぞれにメリット・デメリットがありますので、患者様のお口の状態やご希望を考慮して治療方法を選択します。

3. 手術前の診査

口腔内写真、パノラマレントゲン、歯科用 CT、歯周組織検査を行います。必要に応じてセファロ撮影、口腔内スキャンなどを行います。これらの情報をもとに、顎の骨、神経や上顎洞などの解剖学的な位置、噛み合わせ、歯周組織などを確認します。

4. インプラント治療の流れ

診査 → CT によるシミュレーション → 治療計画の説明 → 埋入手術 → 抜糸 → 治癒期間 → 必要に応じて二次手術 → 型取り → 上部構造装着 → メインテナンス

患者様のお口の状態によって、治療内容や期間は異なります。

5. インプラント埋入手術について

手術は基本的に局所麻酔で行います。静脈内鎮静は当院では行っておりません。手術時間は症例によって異なりますが、比較的簡単な症例では 30 分程度、難しい症例では 1 時間程度を目安としています。状態によっては抜歯と同時にインプラントを埋入する「抜歯即時埋入」を行うことがあります。顎の骨が不足している場合には GBR（骨造成）、上顎では必要に応じてソケットリフトやサイナスリフトなどを行う場合があります。

6. インプラントと骨が結合するまで

インプラントと顎の骨が結合する「オッセオインテグレーション」のための治癒期間を設けます。目安として、

上顎：約 3 か月、下顎：約 2 か月を基本としています。抜歯即時埋入や、GBRなどを同時に行った場合は、通常より長い治癒期間が必要となります。

7. 手術に伴う主なリスク

痛み、腫れ、出血、内出血による皮膚の変色、感染、神経への影響によるしびれ・知覚異常、上顎洞などへの影響、治癒の遅れ、インプラントと骨が十分に結合しない、インプラント周囲炎、インプラントの破折・脱落、再手術やインプラント撤去が必要となる場合があります。患者様の状態に応じて、手術前に個別に説明します。

8. インプラント治療は「入れて終わり」ではありません

インプラントを長く使用するためには、治療後のメンテナンスが重要です。石崎歯科医院では、4 か月ごとの定期検診を基本としてお勧めしています。また、噛み合わせや歯ぎしり・食いしばりによる過度な力を防ぐため、必要な患者様にはナイトガードの使用をお願いしています。

9. 保証について

石崎歯科医院では、インプラント治療終了後 5 年間を保証期間としています。保証の条件として、指示されたナイトガードの使用、指定された 4 か月ごとの定期検診、医院から指示されたメンテナンスの継続をお願いしています。《保障の条件となります》

10. 治療を受ける患者様へ

インプラントは天然の歯とまったく同じものになるわけではなく、外科処置を伴うため一定のリスクがあります。一方で、適切な症例を選択し、治療後も適切なメンテナンスを行うことで、失った歯の機能を回復し、残っている歯への負担を軽減することが期待できます。石崎歯科医院では、ブリッジ・義歯・インプラントそれぞれの特徴を説明したうえで、お口全体の状態を考慮し、治療方法を検討します。

インプラント埋入手術 同意書

石崎歯科医院 殿

私は、インプラント埋入手術を受けるにあたり、以下について説明を受け、内容を理解しました。

- ☐ インプラント治療の目的、治療方法、治療期間について
- ☐ ブリッジ・義歯・インプラントなど、インプラント以外の治療方法について
- ☐ 手術の方法、麻酔、治癒期間および治療後の流れについて
- ☐ 手術に伴う痛み、腫れ、出血、内出血、感染などの可能性について
- ☐ 手術部位によっては、神経への影響によるしびれ・知覚異常、上顎洞などへの影響、治癒の遅れなどが生じる可能性について
- ☐ インプラントが骨と十分に結合しない場合や、インプラント周囲炎、破折、脱落などにより、再治療や撤去が必要となる可能性について
- ☐ 手術中または術後の状態により、追加の処置や治療計画の変更が必要となる場合があることについて
- ☐ 治療後の定期検診、メンテナンスおよびナイトガードの重要性について
- ☐ インプラント治療には一定のリスクがあり、治療結果を完全に保証するものではないことについて
- ☐ 保証制度の内容および保証を受けるための条件について

私は、上記について十分な説明を受け、質問する機会も得ました。

内容を理解したうえで、インプラント埋入手術を受けることに同意します。

同意日 年 月 日

患者氏名

インプラント手術後の注意事項

石崎歯科医院

本日はインプラント手術、お疲れさまでした。手術後は、痛み・腫れ・出血などが起こることがあります。多くは時間とともに改善しますので、以下の注意事項をお守りください。

① 痛みについて

麻酔が切れる頃から痛みが出ることがあります。痛みが強くなる前に、処方された痛み止めを服用してください。効果が現れるまで30分程度かかることがあります。次の服用までの間隔は、処方された薬の指示に従ってください。通常、痛みのピークは手術当日から翌日にかけてですが、鈍い痛みが1週間程度続く場合があります。

② 出血について

唾液に血が混じることがあります。少量の血が混じった唾液は、多くの場合問題ありません。何度も強く唾を吐いたり、強いうがいをしたりすると出血しやすくなりますので避けてください。出血が続く場合は、清潔なガーゼを手術部位に当て、20分程度しっかり圧迫してください。それでも止まらない場合は医院へご連絡ください。

③ 腫れについて

腫れは手術後2～3日頃にピークとなり、その後徐々に改善していくことが一般的です。冷やす場合は短時間にとどめ、長時間・強く冷やし続けないようにしてください。

④ 内出血について

顔の皮膚が紫色や黄色っぽくなる場合があります。内出血によるもので、時間とともに消えていきます。消えるまで2～3週間程度かかる場合があります。

⑤ お薬について

処方された薬は、指示された方法・期間で服用してください。服用後に蕁麻疹、息苦しさ、強い気分不良などの異常が現れた場合は、服用を中止し、医院へご連絡ください。

⑥ うがい・歯磨きについて

手術当日は強いうがいをしないでください。手術部位は担当医から指示された期間、歯ブラシを当てないようにしてください。それ以外の歯は通常どおり清掃してください。

⑦ 食事について

麻酔が切れてから食事をしてください。手術部位を強く噛まないよう、しばらくは柔らかい食事をお勧めします。義歯を使用されている方は、手術部位の状態によって一定期間、義歯の使用を控えていただく場合があります。

⑧ 日常生活について

手術当日は激しい運動を避けてください。飲酒は手術後 3～4 日程度控えてください。入浴は手術当日は控え、シャワー程度にしてください。また、手術後 2～3 日はできるだけ無理をせず、十分な休養をとってください。

⑨ 喫煙について

喫煙は傷の治癒やインプラントの経過に悪影響を及ぼす可能性があります。できる限り禁煙してください。

⑩ ソケットリフトなどを行った場合

上顎の骨造成処置（ソケットリフト等）を行った場合は、**鼻を強くかまないでください**。担当医から指示された注意事項を必ずお守りください。

⑪ このような場合はご連絡ください

強い出血が続く、痛みが時間とともに強くなる、腫れが急激に悪化する、高熱が出る、薬を飲んだ後に異常が出た、しびれなどの症状が気になる、その他不安なことや判断に迷うことがある場合は、自己判断せず石崎歯科医院へご連絡ください。